

COMPTE RENDU D'ÉVALUATION

SUJET : COLOPATHIE FONCTIONNELLE

VALEUR DE L'ÉTUDE : Grade A

NOMBRE DE SUJET : 61

MÉTHODOLOGIE : double aveugle, par tirage au sort. Evaluation effectuée par le professeur Chef de Service

LIEU DE L'ÉTUDE : CHU BESANCON – Service de gastro-antérologie

ANNÉE : 1982-1983

NOMBRE DE THÉRAPEUTES AYANT PARTICIPÉ : 2

AUTEUR : Professeur CARAYON P, GROSJEAN Daniel, BENINI Patrice

RÉSULTATS : amélioration groupe traité : 74 %

Amélioration groupe placebo : 38 % $P \leq 0,01$

Résultats sans changement après une 2^e séance.

RÉSUMÉ : 61 personnes atteintes de colopathie fonctionnelle et sélectionnées par le Professeur CARAYON ont été réparties par tirage au sort entre 1 groupe traité (31) et 1 groupe placebo (30). L'évaluation s'est fait en double aveugle. Les critères de jugement, 1 mois après la séance de microkinésithérapie, sont pour chacun des symptômes présents dans le bilan de départ : disparus ou améliorés = résultat positif, stables ou aggravés = résultat négatif
Il en est de même pour les signes cliniques constatés à l'examen initial.
Résultat : 1a 1^{ère} séance 61 malades inclus, 1 retiré (début de cancer)

	PLACEBO	MICROKINESITHERAPIE	TOTAL
Amélioration	11 (18,3 %)	23 (38,3 %)	34 (56,6 %)
Sans effet	18 (30 %)	8 (13,3 %)	26 (43,6 %)
Total	29 (48,3 %)	31 (51,6 %)	60 (100 %)

Les sujets ayant eu un traitement en microkinésithérapie sont nettement améliorés par rapport au placebo (chi 2 = 6,61 ; p = 0,010)

La 2^e séance ne montre pas de modification par rapport à la 1^{ère} séance. 59 inclus (1 à quitté la région).

	PLACEBO	MICROKINESITHERAPIE	TOTAL
Amélioration	11 (18,3 %)	23 (38,9 %)	34 (57,6 %)
Sans effet	17 (28,8 %)	8 (13,5 %)	25 (42,3 %)
Total	28 (47,5 %)	31 (52,5 %)	59 (100 %)

Les sujets ayant reçu un traitement en microkinésithérapie sont nettement améliorés par rapport au placebo (chi = 5,98 : p = 0,014). Il n'a pas été observé d'aggravation.